



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации пестицида или агрохимиката**

№ 2239

от « 29 » декабря 2011 г.

Настоящее свидетельство выдано ООО «АгроАльянс», 1036164022168
(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Омекс марки: Омекс КальМакс, Омекс 3Х, Омекс Микромакс, Омекс
(наименование пестицида или агрохимиката)

Сиквентил 1, Омекс Сиквентил 2, Омекс Фолиар Борон

получил государственную регистрацию за № 2239-11-204-449-0-0-0-0

на срок по « 28 » декабря 2021 г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами:

Для сельскохозяйственного производства:

Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3
Омекс 3Х	2,5 л/га	Зерновые культуры – некорневая подкормка в фазе выхода в трубку
	Расход рабочего раствора - 300 л/га	
	2,0-2,5 л/га	Кукуруза – некорневая подкормка в фазе 5-7 настоящих листьев
	Расход рабочего раствора - 300 л/га	
	2,0 л/га	Рапс озимый – некорневая подкормка весной в фазе розетки
	Расход рабочего раствора - 300 л/га	
	1,5-2,5 л/га	Овощные, бахчевые культуры – некорневая подкормка в фазе 6-8 настоящих листьев и через 14 дней
	Расход рабочего раствора - 300-600 л/га	
	2,5-3,0 л/га	Картофель – некорневая подкормка в фазе бутонизации и далее 1-2 раза с интервалом 14 дней
Омекс Сиквентил 2	Расход рабочего раствора - 300 л/га	
	2,0 л/га	Лук – некорневая подкормка в фазе 5-7 листьев и далее 2-3 раза с интервалом 14 дней
	Расход рабочего раствора - 300 л/га	
	2,0 л/га	Виноград – некорневая подкормка в период формирования соцветий и через 14 дней
	Расход рабочего раствора - 1000 л/га	
	2,0 л/га	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка дважды до наступления фазы цветения с интервалом 14 дней
	Расход рабочего раствора - 1000 л/га	
	2,5 л/га	Зерновые культуры – некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона с интервалом 10-14 дней
	Расход рабочего раствора -300 л/га	
Омекс КальМакс	3,0 л/га	Технические, кормовые культуры – некорневая подкормка 1-3 раза в течение сезона с интервалом 10-14 дней
	Расход рабочего раствора - 300 л/га	
	2,0-3,0 л/га	Овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка через 3 недели после высадки рассады (или появления всходов) и далее 1-2 раза с интервалом 14 дней
	Расход рабочего раствора - 300-600 л/га	
	3,5-8,5 л/га	Капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская и др.) – некорневая подкормка в период формирования кочана (головки) 2-4 раза с интервалом 10-14 дней
	Расход рабочего раствора 300-600 л/га	
	1,5-3,0 л/га	Овощные, бахчевые культуры – некорневая подкормка в период роста плодов 2-3 раза с интервалом 7-10 дней
	Расход рабочего раствора – 300-600 л/га	
	2,5-5,0 л/га	Картофель – некорневая подкормка в фазе бутонизации и далее 1-2 раза с интервалом 14 дней
	Расход рабочего раствора - 300 л/га	
	5,0-10,0 л/га	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка в период роста и созревания плодов 2-3 раза с интервалом 7-10 дней
	Расход рабочего раствора - 1000 л/га	
	5,0-10,0	Виноград – некорневая подкормка в период с фазы начала смыкания ягод в грозди до созревания 3-4 раза с интервалом 10 дней
	Расход рабочего раствора - 1000 л/га	

1	2	3
Омекс Фолиар Борон	3,0 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Свекла сахарная – некорневая подкормка в фазе 6-8 листьев и далее 2 раза с интервалом 14 дней
	1,0 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Бобовые культуры – некорневая подкормка в фазе бутонизации
	2,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора – 300-600 л/га	Овощные культуры – некорневая подкормка до наступления фазы цветения 2 раза с интервалом 14 дней
	2,0 л/га Расход рабочего раствора 300-600 л/га	Корнеплоды столовые – некорневая подкормка в фазе 6-8 листьев и далее 2 раза с интервалом 14 дней
	1,5-2,0 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Рапс – некорневая подкормка в фазе бутонизации
	2,0 л/га Расход рабочего раствора - 1000 л/га	Виноград – некорневая подкормка до наступления фазы цветения 2 раза с интервалом 14 дней
	2,0 л/га Расход рабочего раствора - 1000 л/га	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка в фазе бутонизации и после цветения
	1,0 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Зерновые культуры – некорневая подкормка в фазе кущения-начала выхода в трубку и в фазе выхода флагового листа
	1,0 л/га Расход рабочего раствора 300 л/га	Картофель – некорневая подкормка в фазе полных всходов и далее 1-3 раза с интервалом 15 дней
Омекс Микромакс	0,75 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Бобовые культуры – некорневая подкормка в фазе начала стеблевания и через 10 дней
	1,0 л/га Расход рабочего раствора – 300-600 л/га	Овощные культуры – некорневая подкормка через 15-20 дней после появления всходов (или высадки рассады) и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
	1,0 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Бахчевые культуры – некорневая подкормка в период начала образования плетей и далее 1-2 раза с интервалом 10 дней
	0,75 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Лук – некорневая подкормка в фазе 5-7 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 14 дней
	1,5 л/га Расход рабочего раствора 1000 л/га	Виноград – некорневая подкормка в период с фазы роста побегов до появления завязей
	1,0-1,5 л/га Расход рабочего раствора 1000 л/га	Плодово-ягодные культуры – некорневая подкормка в фазе бутонизации и после цветения
	2,5 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Бобовые культуры – некорневая подкормка в фазе начала стеблевания и через 14 дней
	2,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора - 300-600 л/га	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка через 3 недели после высадки рассады (или появления всходов) и далее 2 раза с интервалом 10-14 дней
	3,0 л/га Расход рабочего раствора - 300 л/га	Земляника – некорневая подкормка в фазе бутонизации и после цветения
Омекс Сиквентил 1		

Заместитель Руководителя Россельхознадзора

(подпись)

А.И. Саурин
(Ф.И.О.)

М.П.