

## Рекомендации по применению агрохимиката Омекс в защищенном грунте

Культура	Марка	Доза применения*, кг/га в день	Концентрация раствора, %	Применение
Огурец Кабачок Томат Баклажан	Омекс 18-18-18+2MgO+TE,	8-10	0,7	Корневая подкормка в период от высадки рассады до цветения с ежедневным внесением удобрения через систему капельного полива.
	Омекс 20-20-20+TE	8-10	0,7	
	Омекс 13-40-13+TE	6,0 – 8,0	0,7	
	Омекс 10-08-40+TE	10,0-15,0	0,5	
Перец	Омекс 18-18-18+2MgO+TE,	8,0-10,0	0,7	Корневая подкормка в начальный период роста с ежедневным внесением удобрения через систему капельного полива.
	Омекс 20-20-20+TE	8,0-10,0	0,7	
	Омекс 13-40-13+TE	6,0 – 8,0	0,7	
Салат	Омекс 18-18-18+2MgO+TE,	5,0 – 7,0	0,5	Корневая подкормка по необходимости (исходя из результатов листовой и почвенной диагностики) с ежедневным внесением удобрения через систему капельного полива.
	Омекс 20-20-20+TE	5,0 – 7,0	0,5	
	Омекс 13-40-13+TE	6,0-8,0	0,5	
	Омекс 10-08-40+TE	5,0-10,0	0,5	
	Омекс 00-52-34+TE	3,0-5,0	0,5	
Земляника	Омекс 00-52-34+TE	5,0	0,7	Корневая подкормка в период от высадки рассады до цветения с ежедневным внесением удобрения через систему капельного полива.
	Омекс 10-08-40+TE	8,0 – 10,00	1,0	Корневая подкормка после образования завязей с ежедневным внесением удобрения через систему капельного полива.

\*- Расход рабочего раствора – в зависимости от системы полива.