

## Рекомендации по применению агрохимиката Омекс в открытом грунте

Культура	Марка	Доза применения, кг/га в день	Концентрация раствора, %	Применение
Капуста	Омекс 18-18-18+2MgO+TE	5,0-10,0	0,5	Корневая подкормка в начальный период роста (внесение с поливными водами).
	Омекс 20-20-20+TE	5,0-10,0	0,5	
	Омекс 13-40-13+TE	5,0-10,0	0,5	
	Омекс 00-52-34+TE	5,0-10,0	0,5	Корневая подкормка по необходимости, исходя из результатов листовой и почвенной диагностики (внесение с поливными водами).
	Омекс 10-08-40+TE	5,0-10,0	0,5	
Свекла Репа Редис Брюква	Омекс 18-18-18+2MgO+TE	5,0-10,0	0,7	Корневая подкормка в начальный период роста (внесение с поливными водами).
	Омекс 20-20-20+TE	5,0-10,0	0,7	
	Омекс 13-40-13+TE	5,0-10,0	0,7	
	Омекс 00-52-34+TE	5,0-10,0	0,7	Корневая подкормка в период формирования корнеплодов (внесение с поливными водами).
	Омекс 10-08-40+TE	5,0-10,0	0,7	
Огурец Кабачок Томат Баклажан Перец	Омекс 18-18-18+2MgO+TE	8,0 – 10,0	0,5	Корневая подкормка в период от высадки рассады до цветения (внесение с поливными водами).
	Омекс 20-20-20+TE	8,0 – 10,0	0,5	
	Омекс 13-40-13+TE	6,0-8,0	0,5	Корневая подкормка в период от начала образования плодов до конца вегетации (внесение с поливными водами).
	Омекс 10-08-40+TE	12,0-15,0	0,5	
	Омекс 00-52-34+TE	5,0-10,0	0,5	

