

Применение микроудобрений Омекс на сельскохозяйственных культурах.

Плодовые

Культура	Фаза развития	Удобрение	Норма применения л/га	Количество обработок
Яблоня	возобновление вегетации	Омекс Микромакс	1,0 л/га	1
	фаза розового бутона	Омекс фолиар Борон	1,0 л/га	1
	через 10 дней после опадания лепестков	Омекс КальМакс	3,0 л/га	2-4
	рост плодов – созревание	Омекс КальМакс	3,0 л/га	3-4
	после уборки урожая		Омекс Микромакс	1,0 л/га
Омекс фолиар Борон			1,0 л/га	1

1. При возобновлении вегетации для устранения недостатка таких элементов как магний, бор, цинк, рекомендуется применять Омекс Микромакс совместно со средствами защиты растений.
 2. В фазе розового бутона, для обеспечения жизнеспособности пыльцы, процессов опыления и оплодотворения рекомендуется провести обработку формуляцией Омекс фолиар Борон.
 3. В течение вегетации, начиная с момента опадания лепестков, но не позднее 10 дней, для профилактики от горькой ямчатости рекомендуется проведение обработок Омекс КальМакс с интервалом 10 дней.
- Повышение содержания кальция в плодах продлевает их срок хранения.

