

## Рекомендации по применению агрохимиката Омекс в открытом грунте

Культура	Марка	Доза применения, кг/га в день	Концентрация раствора, %	Применение
Лук	Омекс 18-18-18+2MgO+TE	5,0 – 7,0	0,7	Корневая подкормка в период от высадки посева до начала образования луковицы (внесение с поливными водами).
	Омекс 20-20-20+TE	5,0 – 7,0	0,7	
	Омекс 13-40-13+TE	5,0 – 7,0	0,7	
	Омекс 10-08-40+TE	7,0 – 10,00	0,7	Корневая подкормка в период образования луковицы (внесение с поливными водами).
	Омекс 00-52-34+TE	5,0-10,0	0,5	
Зернобобовые	Омекс 10-08-40+TE	5,0-7,0	0,7	Корневая подкормка по необходимости (исходя из результатов листовой и почвенной диагностики), внесение с поливными водами.
	Омекс 00-52-34+TE	5,0 – 8,0	0,5	Корневая подкормка в период от появления всходов до фазы бутонизации (внесение с поливными водами).
Салат	Омекс 18-18-18+2MgO+TE	5,0 – 7,0	0,7	Корневая подкормка по необходимости (исходя из результатов листовой и почвенной диагностики), внесение с поливными водами.
	Омекс 20-20-20+TE	5,0 – 7,0	0,7	
	Омекс 13-40-13+TE	5,0 – 7,0	0,7	
	Омекс 10-08-40+TE	5,0 -10,0	0,7	
	Омекс 00-52-34+TE	5,0 -10,0	0,7	
Зерновые культуры	Омекс 18-18-18+2MgO+TE	5,0-10,0	0,5	Корневая подкормка в начальный период роста (внесение с поливными водами).
	Омекс 20-20-20+TE	5,0-10,0	0,5	
	Омекс 13-40-13+TE	5,0-10,0	0,5	Корневая подкормка в период формирования и налива зерна (внесение с поливными водами).
	Омекс 10-08-40+TE	5,0-10,0	0,7	
	Омекс 00-52-34+TE	5,0-8,0	0,5	
Картофель	Омекс 18-18-18+2MgO+TE	5,0-7,0	0,7	Корневая подкормка в период клубнеобразования (внесение с поливными водами).
	Омекс 20-20-20+TE	5,0-7,0	0,7	
	Омекс 13-40-13+TE	10,0	0,7	
	Омекс 10-08-40+TE	15,0-18,0	0,7	
	Омекс 00-52-34+TE	10,0-15,0	0,5	